



Cittadini



Imprese



Scuole



Ricercatori



Giornalisti



Personale

- Scienze biomediche
- Terra e ambiente
- Fisica e materia
- Bio e agroalimentare

- Chimica e tecnologia materiali
- Ingegneria, ICT, energia e trasporti
- Scienze umane e patrimonio culturale

HOME

CHI SIAMO ▾

ORGANIZZAZIONE ▾

ATTIVITÀ ▾

SERVIZI E UTILITÀ ▾

NEWS

EVENTI

Home / Comunicati stampa / Misurare il pH intracellulare, in modo automatico e veloce

COMUNICATO STAMPA

Misurare il pH intracellulare, in modo automatico e veloce

17/05/2022

Elaborata una nuova metodologia, efficace e accurata, per rilevare la variazione di acidità degli organelli cellulari. Un percorso estremamente complesso, legato a disfunzioni e all'insorgenza di malattie, in particolare il cancro. Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Istituto di nanotecnologia del Cnr di Lecce assieme ai colleghi dell'Università del Salento, è pubblicato sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces, aggiudicandosi l'immagine di copertina

Le variazioni a livello intracellulare di pH, cioè di acidità, sono tra l'altro indicative dell'insorgenza e della progressione di malattie come il cancro. Anche per questo il loro studio è importante quanto impegnativo, poiché tali alterazioni coinvolgono meccanismi estremamente complessi. Un recente studio coordinato da Loretta L. del Mercato, primo ricercatore dell'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, condotto in collaborazione con Cecilia Bucci e Adriano Barra, docenti dell'Università del Salento, ha portato alla elaborazione di una nuova metodica per studiare in modo efficace e accurato il pH degli organelli cellulari. La ricerca è pubblicata sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces.

"All'interno di una cellula animale, la funzione degli organelli dipende anche dall'instaurarsi e dal mantenimento di un determinato pH in ciascuno di loro. Un equilibrio dinamico e finemente regolato nel processo di importazione di protoni negli organelli è alla base dell'omeostasi del pH, nel citoplasma e in altri compartimenti cellulari", spiega Cecilia Bucci, "Il sistema endo-lisomiale svolge un ruolo centrale in numerosi processi cellulari e, in condizioni fisiologiche, il pH diminuisce progressivamente lungo la via endocitica, ossia dagli endosomi fino ai lisosomi. Questo garantisce che gli organelli della via endocitica funzionino correttamente".

Il team di ricerca di Cnr-Nanotec e Università del Salento ha sviluppato sensori ottici raziometrici estremamente stabili e sensibili che possono essere utilizzati per misurare, con risoluzione spaziale e temporale elevata, il movimento di acidificazione di singoli organelli intracellulari, quali endosomi e lisosomi.

"Il verificarsi di difetti nell'acidificazione degli organelli endocitici contribuisce in modo significativo all'insorgere di disturbi da accumulo lisomiale (disturbi metabolici ereditari), malattie neurodegenerative, malattie autoimmuni e malattie infettive oltre alla formazione e diffusione del tumore", spiega Loretta L. del Mercato. "Studiare l'acidificazione intracellulare per individuare i diversi meccanismi molecolari che controllano questo processo e sviluppare strategie che siano in grado di contrastare le disfunzioni cellulari all'origine delle malattie, risulta quindi determinante. Lo è in particolar modo per il cancro, dove l'alterazione dell'acidificazione è un evento precoce nonché un segno distintivo e fondamentale della progressione. Oltre a misurare le variazioni di pH nel citoplasma e nello spazio extracellulare, è molto importante monitorarle con precisione negli organelli endocitici di cellule tumorali con diversi stadi di malignità".

I sensori ottici oggetto dello studio sono stati appunto inseriti in cellule tumorali con diverso grado di malignità e monitorati mediante microscopia laser confocale *time lapse*. "Per seguire il movimento dei sensori nel tempo e quantificare i loro segnali di fluorescenza relativi al pH del microambiente, è stato sviluppato un nuovo metodo computazionale", aggiunge Adriano Barra. "Tale approccio si basa sull'osservazione che i sensori che registrano costantemente il pH extracellulare ed intracellulare danno luogo a distribuzioni di segnali monomodali, mentre i sensori che misurano il pH prima fuori dalla cellula e poi dentro, dopo essere stati internalizzati, cioè catturati dalla cellula stessa, forniscono segnali bimodali. Quest'osservazione permette una classificazione dei sensori in tre categorie (sensori extracellulari, sensori che vengono internalizzati, sensori già internalizzati) mediante *cluster detection* e permette un *high throughput screening* totalmente automatizzato".

"La mappatura dinamica del pH a livello di singoli organelli endocitici è fondamentale per comprendere meglio come questo influenzi i diversi processi cellulari", conclude Cecilia Bucci. "L'uso dei sensori accoppiato a tecniche avanzate di imaging raziometrico di cellule viventi, in combinazione con questo nuovo approccio computazionale, consente l'analisi di migliaia di eventi in modo algoritmico poco costoso e più veloce rispetto ai metodi standard".

Tale metodologia, convengono gli autori del lavoro, potrebbe essere utilizzata per monitorare il pH e molti altri processi cellulari associati all'endocitosi in modelli cellulari complessi.

Per informazioni:

Loretta L. del Mercato

Cnr-Nanotec

loretta.delmercato@nanotec.cnr.it

Responsabile comunicazione Cnr-Nanotec: Gabriella Zammillo; email: gabriella.zammillo@nanotec.cnr.it

Ufficio stampa:

Emanuele Guerrini

emanuele.guerrini@cnr.it

Capo ufficio stampa:

Marco Ferrazzoli


marco.ferrazzoli@cnr.it

ufficiostampa@cnr.it

06 4993 3383

Vedi anche:

- [Link all'articolo](#)



Copertina del fascicolo ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 16, 18005-19080

TROVA SUBITO

Chi siamo

Dove siamo

Contatti

URP

Bandi e gare

Concorsi

RSS

Amministrazione trasparente

Siti tematici

Note legali

Dichiarazione di accessibilità

Segnalazioni accessibilità

Privacy e Cookie policy

Credits

CANALI

Cittadini

Imprese

Scuole

Ricercatori

Giornalisti

Personale

AREE TEMATICHE

Scienze chimiche e tecnologie dei materiali

Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente

Scienze fisiche e tecnologie della materia

Scienze bio-agroalimentari

Scienze biomediche

Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti

Scienze umane e sociali, patrimonio culturale

SEGUICI SU

